



疫苗 比一比

AZ 疫苗

腺病毒載體

Moderna 疫苗

mRNA

高端 疫苗

蛋白質
次單元疫苗

接種劑量: 2劑 

共同常見副作用 

注射部位疼痛、肌肉痛、發燒、頭痛

常見副作用

疲倦、畏寒、關節痛

壓痛、痠痛/全身無力、
腹瀉、注射部位腫脹/
硬結、噁心/嘔吐、注射
部位泛紅



เปรียบเทียบวัคซีน แต่ละยี่ห้อ

วัคซีนแอสตราเซเนกา

อะดีโนไวรัสเป็นพาหะ

วัคซีน Moderna

mRNA

วัคซีนเกาตวน

โปรตีนซับยูนิต

ปริมาณการฉีดวัคซีน: 2 โดส 

ผลข้างเคียงที่พบบ่อยร่วมกัน 

ปวดบริเวณที่ฉีด, ปวดกล้ามเนื้อ, มีไข้, ปวดศีรษะ

ผลข้างเคียงที่พบบ่อย

อ่อนเพลีย, หนาวสั่น, ปวดข้อต่อกระดูก

มีอาการกตเจ็บ, ป่วยเมื่อ/
ร่างกายไม่มีแรง,
ท้องเสีย,
มีอาการบวมบริเวณที่ฉีดวัคซีน/
เกิดตุ่มนูนแข็ง, คลื่นไส้/อาเจียน,
เกิดรอยแดงบริเวณที่ฉีดวัคซีน



Comparing vaccines

AZ Vaccine

Adenovirus Vector

Moderna vaccine

mRNA

Medigen vaccine

Protein subunit vaccine

Vaccination doses: Two



Common shared side effects



Pain at the injection site, muscle soreness, fever, headache

Common side effects

Fatigue, chills, joint pain

Tenderness, aches/
exhaustion
diarrhea, swelling/
hardness at the
injection site, nausea/
vomiting, redness at
the injection site



So sánh tác dụng phụ của các loại vắc-xin

Vắc-xin AZ

vắc-xin vector adenovirus

Vắc-xin Moderna

vắc-xin mRNA

Vắc-xin MVC

Vắc xin tiểu đơn vị protein (protein subunit)

Liều lượng: 2 mũi



Các tác dụng phụ chung thường gặp

Vết tiêm bị đau, đau cơ, bị sốt, đau đầu

Tác dụng phụ thường gặp

Mệt mỏi, ớn lạnh, đau nhức khớp

Đau khi ấn vào, nhức mỗi/toàn thân rã rời, tiêu chảy, vết tiêm bị sưng/nổi cục cứng, buồn nôn/nôn mửa, vết tiêm bị đỏ.



Perbandingan Jenis Vaksin

AZ Vaksin

Vektor
Adenovirus

Moderna Vaksin

mRNA

Medigen Vaksin

Protein
Subunit

Dosis vaksinasi: 2 dosis



Kesamaan efek samping yang sering dijumpai

Nyeri pada bagian yang disuntik, nyeri otot,
demam, sakit kepala

Efek samping umum

Lelah, menggigil, nyeri sendi

Ngilu, nyeri/seluruh
badan tidak bertenaga,
diare, bagian yang
disuntik membengkak/
mengeras, mual/muntah,
bagian yang disuntik
memerah